


____ ちゃんの投薬スケジュール

月	火	水	木	金	土	日




1回の投与量は _____ mL

次の再診日は 月 日 () です。

* 飲み始めの1週間は嘔吐・下痢が出ることがあります。症状がひどいときは獣医の先生と相談してください。

ワンちゃんと飼い主に寄り添うお薬
シクラバンス®

飼い主の
皆さまへ



いつも

かゆそうに

している

ワンちゃん。

少しでも
かゆみをおさえて
あげられたら

もっと
飲ませやすい
お薬はないかな

今飲んでいる
お薬効いて
いないのかな



飼い主さんの不安を 『シクラバンス®』が解消します!



製品の詳細は
こちら!

シクラバンス®って何?

有効成分はシクロスポリン。
カプセルよりも飲ませやすい、
液体のお薬です。



有効成分の 「シクロスポリン」って何?

シクロスポリンはステロイドや抗生
剤とは違い、かゆみだけを一時的に
抑えるのではなく炎症細胞に働き
かけ炎症の原因を元から改善します。



シクロスポリンは効果がでるまでに
約4週間程度かかります。
その間、他のかゆみ止めと一緒に
処方(併用)される事があります。
お薬の使用については獣医の先生
の指示に従ってください。



シクラバンス®の 使い方



各部位の名称



STEP 1



プラスチックキャップを外す。

STEP 2



バイアルアダプターをバイアル
上部のゴムに差し込む。

STEP 3



投薬シリンジをバイアルアダ
プターの先端に差し込み、時計
回りに止まるところまで回す。

STEP 4



バイアルを逆さ（床と垂直）
にして持ち、投薬シリンジ
のプランジャをひいて、
必要量を取り出す。
（例）0.3mLを投与する場合

STEP 5



バイアルアダプターを押さ
えながら、投薬シリンジを
反時計回りに回して取り外す。

STEP 6



投薬シリンジを直接犬の口
に入れ投与する。

投与後



使用後は投薬シリンジの外側
を乾いた紙などで拭く。（水
洗いはしない）
バイアルアダプターは装着し
たままで保管する。



詳しくは映像で！



はじめてのシクラバンス®

Q&A



Q シクラバンス® は
毎日飲むの？



A 飲み始めの4週間は1日1回飲みます。

その後、1日おきから週2日に減らすことができます。
減らすタイミングは獣医の先生と相談しましょう。

Q シクラバンス® は
ずっと飲み続けるの？

A 基本的には飲み続けます。

けれど、かゆみなどの症状が改善されれば飲む回数を
減らすことができます。



Q シクラバンス® を飲ませるとき
注意することはありますか？

A 飲み始めに嘔吐や下痢の症状が
見られることがあります。

飲み始めの1週間程度に見られるようです。

これらの症状は自然になくなることが多い
ですが、症状が続く場合は獣医の先生と相談
してください。



より詳細なQ&Aは
弊社ホームページをご覧ください。



ワンちゃんとの毎日をもっと楽しく過ごしやすい。

シクラバンス® は飼い主さんの気持ちに寄り添うお薬です。
無理はしないで、ワンちゃんのペースに合わせて
ゆっくり取り組みましょう。

かゆみのサインを早めに見つけよう！

☐ 口の周り・目の周りの
皮膚が赤い

☐ 床に顔を
こすりつけている

☐ 夜眠っているときに
飛び起きてかく

☐ 指先をしゃぶる
ように舐める

