

2018年4月作成

貯法

室温保存

動物用医薬品

承認指令書番号

販売開始

21動薬第4099号

2011年12月

リンコサミド系抗菌剤 | 要指示医薬品 | 指定医薬品

**Virbac**

## ビルデンタマイシン® 75

ビルデンタマイシン®75はリンコサミド系抗生物質のクリンダマイシン塩酸塩を有効成分として  
います。ブドウ球菌、嫌気性菌に対して抗菌活性を有します。

### 【成分及び分量】

本品1錠中、クリンダマイシン塩酸塩を75.0mg  
(力価)含有する。

### 【効能又は効果】

**有効菌種:**ブドウ球菌、ペプトストレプトコッカス、フソバクテリウム、バクテロイデス

**適応症:**犬:歯周病

### 【用法及び用量】

本剤は、1日12時間間隔で2回、1回体重1kgあたりクリンダマイシンとして5mg(力価)を5~10日間経口投与する。

犬:体重7.5kgあたり本品1/2錠を12時間ごとに経口投与する。

### 【使用上の注意】

#### (基本的事項)

#### 1. 守らなければならないこと

##### (一般的注意)

- ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。

##### (取扱い及び廃棄のための注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・使用済みの空容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

#### 2. 使用に際して気を付けること

##### (使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

##### (犬に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・投与開始後はブラッシング等歯肉縁上のプラークコントロールを行うことが望ましい。

